
ПОЛИПОЗНЫЙ РИНОСИНУСИТ





Ким, И. А. Особенности приверженности лечению больных хроническим риносинуситом с полипами носа / И. А. Ким, Е. В. Носуля, Д. Р. Рагимова // Вестник оториноларингологии. – 2022. – Т. 87, № 1. – С. 81-86.

Одним из резервов повышения эффективности медикаментозной терапии хронического полипозного риносинусита является улучшение приверженности лечению. Поскольку факторы, препятствующие соблюдению режима лечения, отличаются сложностью и разнообразием, меры по улучшению приверженности лечению сохраняют актуальность и носят междисциплинарный характер.

https://elibrary.ru/item.asp?id=48078131



Плейоморфизм цитокинового профиля в ткани полипов в зависимости от фенотипа полипозного риносинусита / Е. Л. Савлевич, А. В. Зурочка, О. М. Курбачева [и др.] // Вестник оториноларингологии. – 2023. – Т. 88, № 1. – С. 50-56.

Каждый фенотип полипозного риносинусита характеризуется определенным механизмом локального воспаления, что подтверждает необходимость диагностики бронхиальной астмы и респираторной аллергии у этих пациентов. Определение локального цитокинового профиля при фенотипах полипозного риносинусита в последующем может способствовать подбору таргетной антицитокиновой терапии для пациентов, у которых это заболевание плохо поддается базисной кортикостероидной терапии.


https://elibrary.ru/item.asp?id=50357214



Опыт применения дупилумаба в лечении хронического риносинусита с полипами / Н. В. Бойко, И. В. Стагниева, О. Е. Лодочкина, Н. В. Курбатова // Вестник оториноларингологии. – 2023. – Т. 88, № 4. – С. 46-53.

Изменения, выявленные при спиральной компьютерной томографии околоносовых пазух, характеризуемые по шкале Lund-Mackay, результаты по SNOT-22 и ACT являются наиболее демонстративными и могут быть использованы для оценки успешности лечения биологическими препаратами больных хроническим риносинуситом с полипами.

https://elibrary.ru/item.asp?id=54619615



Шачнев, К. Н. Тактика лечения обострений хронического риносинусита у больных полипозным риносинуситом в сочетании с аллергическим ринитом / К. Н. Шачнев, В. И. Егоров, Е. Ю. Савушкина // Российская оториноларингология. – 2023. – Т. 22, № 1(122). – С. 47-53.

В ходе исследования был оценен бактериологический состав микрофлоры полости носа и околоносовых пазух, проведено тщательное обследование пациентов, назначено лечение в соответствии со степенью тяжести и разработанной схемой. Была показана необходимость комплексной диагностики и персонализированного лечения при обострении хронического гнойного риносинусита у больных с полипозным риносинуситом в сочетании с аллергическим ринитом, а эффективность разработанной схемы лечения была подтверждена как субъективными, так и объективными методами.


https://elibrary.ru/item.asp?id=50425319



Применение таргетной терапии у пациентов с бронхиальной астмой и полипозным риносинуситом / Т. Р. Касьянова, Ж. М. Кенесариева, Е. А. Ковалева [и др.] // Эффективная фармакотерапия. – 2023. – Т. 19, № 26. – С. 22-24.

Для ингибирования эффектов ИЛ-4 и ИЛ-13 было создано человеческое моноклональное антитело дупилумаб (Дупиксент), зарегистрированное в России в 2019 г. и включенное в федеральные клинические рекомендации по БА в 2021 г. Эффект препарата реализуется за счет его связывания с IL-4Rα-субъединицей и блокады передачи сигналов ИЛ-4/ИЛ-13. Дупилумаб может применяться не только при БА тяжелого течения, но и при среднетяжелом течении заболевания. Препарат особенно эффективен при сочетании БА и ХПРС с высокой эозинофилией крови. В статье представлен клинический случай применения дупилумаба у пациентки в возрасте 24 лет с БА среднетяжелого течения и ХПРС.

https://elibrary.ru/item.asp?id=54372904



Эозинофилия крови у пациентов с тяжелой бронхиальной астмой и хроническим полипозным риносинуситом, получающих лечение дупилумабом / А. Ю. Петухова, А. С. Громов, Р. В. Соловьев [и др.] // Терапевтический архив. – 2024. – Т. 96, № 3. – С. 303-308.

В статье представлены научный обзор и собственный опыт ведения пациентов с дупилумаб-ассоциированной эозинофилией, а также алгоритм обследования данной группы больных с целью своевременной диагностики таких заболеваний, как эозинофильный гранулематоз с полиангиитом, эозинофильная пневмония и др. Необходимо отметить, что чаще всего эозинофилия во время таргетной терапии дупилумабом носит временный характер и не вызывает клинических проявлений.


https://elibrary.ru/item.asp?id=65678629



Цитокиновый профиль ткани носовых полипов и клиническая характеристика пациентов с разной степенью медикаментозного контроля и тяжести течения полипозного риносинусита / Е. Л. Савлевич, Е. В. Любимова, А. В. Зурочка [и др.] // Медицинская иммунология. – 2024. – Т. 26, № 3. – С. 533-544.

Лечение пациентов в зависимости от клинических фенотипов полипозного риносинусита (ПРС) по наличию или отсутствию респираторной аллергии или бронхиальной астмы позволяет улучшить медикаментозный контроль и снизить рецидив ПРС.


https://elibrary.ru/item.asp?id=65613849



Роль эпителия в патогенезе хронического риносинусита с назальными полипами: клетки и медиаторы / Е. Г. Слесарева, Ю. Н. Чистякова, Д. А. Вологжанин [и др.] // Российская оториноларингология. – 2024. – Т. 23, № 1(128). – С. 66-74.

Дисфункция эпителиального барьера является общим признаком хронического риносинусита, прямо или косвенно индуцированного эндотип-специфичными цитокинами. Синоназальный эпителий не только выполняет функцию пассивного барьера, но и является активным иммунологическим органом с врожденными и адаптивными компонентами. В ткани назального полипа присутствуют многочисленные популяции иммунных клеток, которые секретируют множество различных цитокинов и хемокинов и взаимодействуют между собой и с клетками синоназального эпителия.

https://elibrary.ru/item.asp?id=62679299



Оценка назальных симптомов в комплексе с нейрокогнитивным тестированием у пациентов с хроническим полипозным риносинуситом / В. Г. Косенко, И. С. Элизбарян, Л. А. Лазарева [и др.] // Психиатрия и психофармакотерапия. – 2024. – Т. 26, № 1. – С. 36-42.

Междисциплинарный подход в оценке клинических проявлений у пациентов с полипозным риносинуситом, основанный на включении в исследование тестирования нейрокогнитивных нарушений, позволяет более полно оценить влияние патологического процесса на организм пациента. Включение МоСА теста в комплекс пред- и постоперационных исследований позволяет сформировать индивидуализированный подход в реализации терапевтических и реабилитационных мероприятий у данной категории пациентов.

https://elibrary.ru/item.asp?id=61335962



Поляков, Д. П. Патогистологическая характеристика хронического полипозного риносинусита на фоне муковисцидоза у детей / Д. П. Поляков, А. А. Погодина, К. А. Оганян // Российская оториноларингология. – 2024. – Т. 23, № 5(132). – С. 107-111.

Приводится анализ данных отечественной и зарубежной литературы, посвященной изучению особенностей патоморфологической картины слизистой оболочки полости носа и околоносовых пазух на фоне муковисцидоза. Показано, что существуют выраженные различия в строении слизистой оболочки у пациентов с хроническим полипозным риносинуситом на фоне муковисцидоза и без него. Однако все исследования, посвященные изучению патоморфологической структуры слизистой оболочки полости носа и околоносовых пазух у пациентов с муковисцидозом, опираются на достаточно небольшие выборки, что служит существенным ограничением данных работ.

https://elibrary.ru/item.asp?id=73233061



Будковая, М. А. Полипозный риносинусит как первый этап в развитии эозинофильного гранулематоза с полиангиитом / М. А. Будковая, С. А. Реброва // Российская ринология. – 2024. – Т. 32, № 2. – С. 157-166.

Эозинофильный гранулематоз с полиангиитом является редким мультисистемным воспалительным заболеванием и остается сложным для диагностики и выбора тактики лечения. Своевременная диагностика позволит начать лечение в более ранние сроки и значимо улучшить прогноз заболевания. При этом точность диагноза напрямую зависит от комплексного и персонализированного подхода к пациентам и взаимодействия между врачами разных специальностей (оториноларингологов, аллергологов-иммунологов, ревматологов, пульмонологов).

https://elibrary.ru/item.asp?id=67931198



Дюкова, И. А. Комбинированный подход в лечении больных с хроническим полипозным риносинуситом / И. А. Дюкова, А. П. Ястремский, А. В. Володеев // Российская оториноларингология. – 2024. – Т. 23, № 2(129). – С. 25-30.

Проведение полипотомии носа до начала таргетной терапии у пациентов с хроническим полипозным риносинуситом 2-го типа и выраженной назальной обструкцией способствует улучшению качества жизни по опроснику SNOT-22 до начала лечения дупилумабом.


https://elibrary.ru/item.asp?id=67851047



Краткие исторические аспекты полипозного риносинусита, отдельные вопросы морфогенеза и морфологических методов диагностики: обзор итературы / М. А. Ленгина, А. М. Коркмазов, В. И. Попадюк [и др.] // Оториноларингология. Восточная Европа. – 2024. – Т. 4, № 3. – С. 411-422.

Широко используемый арсенал методов диагностики и техник лечения ПРС базируется на знаниях иммунологических, патофизиологических и патоморфологических механизмов возникновения заболевания. Использование современных методов исследования, таких как люминесцентная микроскопия, гистоавторадиография и лектиногистохимия, позволит в большей степени определить структурную организацию полипозной ткани при хроническом риносинусите, что необходимо для прогнозирования возможного рецидива и коррекции лечения заболевания.

https://elibrary.ru/item.asp?id=72059121



Современный взгляд на проблему терапии рецидивирующего полипозного риносинусита: сравнительное исследование эффективности применения различных препаратов моноклональных антител / А. И. Крюков, А. В. Гуров, Д. С. Фомина [и др.] // Медицинский совет. – 2024. – Т. 18, № 23. – С. 80-86.

Изученные молекулы показали эффективность в терапии хронического полипозного риносинусита. Однако наиболее предпочтительной молекулой, использование которой позволяет достичь более выраженного регресса основной клинической симптоматики, снижения степени рецидивирования полипозного процесса с отсутствием потребности в повторных хирургических вмешательствах, а также позволяющей добиться улучшения качества жизни пациентов, явился дупилумаб.

https://elibrary.ru/item.asp?id=80262646



Перспективы оценки уровня тканевого IgE и применения биологической терапии у детей с полипозным риносинуситом / Е. И. Шабельникова, А. Н. Пампура, А. И. Асманов, Н. Д. Пивнева // Российский вестник перинатологии и педиатрии. – 2024. – Т. 69, № 4. – С. 11-15.

В обзоре описан механизм Т2-воспаления и его взаимосвязь с хроническим полипозным риносинуситом. Авторами проведены поиск и систематизация данных о лечении пациентов больных риносинуситом с использованием моноклональных антител, которые воздействуют на различные биомаркеры, затронута проблема локального IgE-воспаления в слизистой оболочке носа.


https://elibrary.ru/item.asp?id=69066015



Лазарева, А. М. Иммунологические особенности различных фенотипов хронического риносинусита / А. М. Лазарева, О. В. Смирнова // Медицинская иммунология. – 2025. – Т. 27, № 2. – С. 275-286.

Цель обзора - изучение по данным литературы влияние первой линии защиты компонентов врожденного и приобретенного иммунитета на патогенез полипозного и неполипозного ХРС.

https://elibrary.ru/item.asp?id=80430297



Дементьева, М. А. Механизмы патогенеза и биологической терапии хронического полипозного риносинусита (обзор литературы) / М. А. Дементьева, О. П. Гумилевская, Б. Ю. Гумилевский // Вестник новых медицинских технологий. – 2024. – Т. 31, № 3. – С. 23-28.

Применение препаратов биологической терапии у пациентов с тяжелым течением хронического полипозного риносинусита позволило взять под контроль симптомы этого сложного заболевания. Однако отсутствие стопроцентного отклика со стороны симптома потери обоняния, а также наличие слабого или умеренного ответа на лечение у части пациентов требует продолжения исследований известных уже моноклональных антител и необходимости разработки новых и/или комбинации имеющейся таргетной терапии, действующей на разные точки патогенеза заболевания.

https://elibrary.ru/item.asp?id=70861915



Ким, И. А. Полипозный риносинусит. Современные подходы к диагностике и лечению : учебное пособие / И. А. Ким. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 56 с.

https://medbase.ru/book/ISBN9785970477038/call_reader.html?SSr=07E907022756F

Цель данного учебного пособия — формирование у обучающегося современных и целостных знаний о распространенности, патогенезе, особенностях диагностики и лечения полипозного риносинусита. В пособии приведены данные о клинических проявлениях, новейших методах диагностики и лечения полипозного риносинусита.

Р-114905 / П 12-НО

Павлуш, Дмитрий Георгиевич.

Типология и морфохимическая характеристика полипозного **риносинусит**а : специальность 1.5.22. "Клеточная биология" : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук / Д. Г. Павлуш ; Тихоокеан. гос. мед. ун-т. - 2023. - 27 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 25-27 (22 назв.)

https://www.dissercat.com/content/tipologiya-i-morfokhimicheskaya-kharakteristika-polipoznogo-rinosinusita/read/pdf

Р-114715 / Ш 32-НО

Шачнев, Константин Николаевич.

Прогнозирование клинического течения и определение тактики ведения больных полипозным **риносинусит**ом : специальность 3.1.3. "Оториноларингология" : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук / К. Н. Шачнев ; Нац. мед. исслед. центр оториноларингологии ФМБА России. - 2023. - 29 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 26-28 (10 назв).

https://www.dissercat.com/content/prognozirovanie-klinicheskogo-techeniya-i-opredelenie-taktiki-vedeniya-bolnykh-polipoznym/read/pdf